



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 45203

от "13 января 2017"

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)**

П Р И К А З

от 13 декабря 2016 г.

№ 552

Москва

**Об утверждении нормативов качества воды водных объектов
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения**

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. № 484 «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 27, ст. 3286; 2012, № 44, ст. 6026) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Министр

А.Н. Ткачев

Верно:

Старший специалист 1 разряда отдела контроля,
проверки исполнения и архива Депуправдела

В.В. Захарова


Показатели качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения	Категории водного объекта рыбохозяйственного значения	
	высшая и первая	вторая
Биохимическое потребление кислорода за 5 суток БПК ₅	При температуре 20°C под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать	
	2,1 мг/дм ³	2,1 мг/дм ³
Биохимическое потребление кислорода БПК _{полн}	При температуре 20°C под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать	
	3,0 мг/дм ³	3,0 мг/дм ³
	Если в зимний период содержание растворенного кислорода в водных объектах высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм ³ , а в водных объектах второй категории до 4 мг/дм ³ , то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водного объекта	
Токсичность воды	Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты	

Таблица № 2.



**НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ**

1	2	3	4	5	6
Абиетиновая кислота C ₂₀ H ₃₀ O ₂	514-10-3	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
Авиксил 70% с.п. ²⁾ Состав: оксадиксил, 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин д.в. C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₄ - 9 или 8%, поликарбацин технический, комплекс цинковой соли этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты с этилен - тиурамдисульфидом д.в. - 74%		токс	0,0003	2	ГХ, ТСХ по оксадиксилу, колориметрия по поликарбацину
Адипат аммония C ₆ H ₁₆ N ₂ O ₄	19090-60-9	сан	0,5	4	ГХ, ГХМС
Алипиновая кислота, гександиовая кислота C ₆ H ₁₀ O ₄	124-04-9	токс	6,0	4	ГХ, ГХМС
Алипиновой кислоты диметилловый эфир C ₈ H ₁₄ O ₄	627-93-0	токс	0,2	4	ГХ, ГХМС
Азоцен 5% с.п. ²⁾ Триадимефон, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлор-фенокси)-бутанон-2 д.в. - 5,5%	43121-43-3	сан-токс	0,1	3	ГХ, ТСХ по триадимефону

Акриламид, пропенамид C ₃ H ₅ NO	79-06-1	ТОКС	0,35	4	ГХ, ГХМС
Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота C ₃ H ₄ O ₂	79-10-7	ТОКС	0,003	3	ГХ, ГХМС
Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3, сополимер метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты $\left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} \\ \quad \\ \text{C}=\text{O} \quad \text{C}=\text{O} \\ \quad \\ \text{OCH}_3 \quad \text{OC}_4\text{H}_9 \end{array} \right)_m \left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{COOH} \end{array} \right)_n$		сан	0,01	3	ГХ, ГХМС
Акриловой кислоты 2-этилгексильный эфир, 2ЭГА C ₁₁ H ₂₀ O ₂	103-11-7	орг	0,001	3	ГХ, ГХМС
Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой кислоты C ₃ H ₃ N	107-13-1	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС
Акромидан - ЛК, метакрилоксиэтилтриметиламмония сульфометильная соль C ₁₀ H ₂₁ NO ₆ S	6891-44-7	ТОКС	0,0001	2	ВЭЖХ
Алифатические амины высшие, смесь первичных алифатических аминов C _n H _{2n+1} NH ₂ , n=17-20		ТОКС	0,0003	3	ГХ, ГХМС по компонентам
Алкилбензолсульфонат натрия C ₁₈ H ₂₉ NaO ₃ S	69669-44-9	ТОКС	0,03	3	ВЭЖХ
Алкил C ₁₀ -C ₁₆ -диметил-бензолметанаммоний хлорид Синонимы: N,N-Диметил-N-алкил C ₁₀ -16-бензиламмоний хлорид, алкил C ₁₀ -16-диметилбензиламмоний хлорид, алкилбензидиметиламмоний хлорид, АБД - хлорид, каташин АБ, бензидиметилалкиламмоний хлорид, (алкил) (бензил) (диметил)-аммоний хлорид Продукт R-8099 E C ₁₇ H ₃₀ ClN	8001-54-5/ 63449-41-2/ 68424-85-1	ТОКС	0,005	3	ВЭЖХ Спектрофотометрия
		ТОКС	0,005**	3	

<p>Алкилпиридиний бромиды (смесь солей гептил, октил, нонил пиридиния) Синонимы: бромистые соли алкилпиридиния</p> <div style="text-align: center;">  <p>$C_nH_{2n+1}-N^+ \left[\text{ring} \right] Br^-$</p> <p>$n = 7, 8, 9$</p> </div>		ТОКС	0,8**	4	ВЭЖХ
<p>Алкилополиамин, N-алкил (жирных кислот таллового масла) полиэтенполиамин, $[\{ RCOOH \}_m \{ -CH_2 - NH_2 - \}_n]_x$</p>	68910-93-0	сан-ТОКС сан-ТОКС	0,1 0,1**	4 4	ВЭЖХ
<p>Алкилсульфат первичный (в техническом препарате до 16% сульфата натрия) $R_2SO_4; R = C_nH_{2n+1} \quad n=12-14$</p>		орг (пена), ТОКС	0,2	4	ВЭЖХ
<p>Алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) $C_nH_{2n+1}OSO_3Na, n = 10-12$</p>		сан	0,5	4	ВЭЖХ
<p>Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате до 15% хлорида натрия) $C_nH_{2n+1}SO_3Na, n=12-15$</p>		ТОКС	0,5	4	ВЭЖХ
<p>Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе, натриевые соли алкилсульфокислот $C_nH_{2n+1}SO_3Na, n=11-12$</p>		ТОКС	0,5	4	ВЭЖХ
<p>Алкилсульфонат натрия на синтине, натриевые соли алкилсульфокислот (паста) $C_nH_{2n+1}SO_3Na, n=13-14$</p>		ТОКС	1,0	4	ВЭЖХ
<p>Аллилацетат $C_5H_8O_2$</p>	591-87-7	ТОКС	0,05	4	ГХ, ГХМС
<p>1-(β-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил) имидазол Имазаил $C_{14}H_{14}Cl_2N_2O_2$</p>	35554-44-0	ТОКС	0,001	3	ГХ

<p>Алмазис 600 г/кг, в.д.г. Состав: метсульфурон-метил д.в. – 60 % сульфонол Н-1 неонол АФ-12 кальция хлорид каолин</p>		токс	0,01	3	ВЭЖХ по метсульфурон–метил
<p>Альбит Состав: гидролизат бактерий <i>Vacillus Megaterium</i> – 30,77%, поли-бета-гидроомасляная кислота (нерастворимые гранулы) – 0,62%, калий азотнокислый – 9,23% калий фосфорнокислый – 9,23% карбамид (мочевина) – 18,46% магний сернокислый – 6,15% вода – до 100%</p>		сан-токс	1,0	4	Фотоколметрия по фосфат–аниону в соответствии с требованиями водного объекта
<p>Алюминий¹⁾ Al</p>	7429-90-5	токс	0,04	4	ААС, ИСП
<p>Алюминия оксихлорид (гидрооксихлорид) AlClO (AlCl(OH)₂)</p>	1327-41-9	сан.-токс	0,5** 0,04** ион Al	3	ААС по алюминию
<p>Алюминия сульфат, алюминий сернокислый Al₂(SO₄)₃</p>	10043-01-3	токс	по веществу 0,04 в пересчете на Al ³⁺	4	ААС, ИСП по Al
<p>Алпомокалиевые квасцы, калия-алюминия сульфата додекагидрат KAl(SO₄)₂·12H₂O</p>	7784-24-9	токс	0,63 по веществу 0,04 в пересчете на Al ³⁺	4	ААС, ИСП по Al

<p>Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт (АККФ) Состав: сернокислый алюминий $Al_2(SO_4)_3$ – 8,4-9,4% кремниевая кислота H_2SiO_3 – 3,8-4,4% Na_2SO_4 – 2,8% K_2SO_4 – 1,15% вода – 80-82% рН – 1,7-2,3</p>		токс	2,45 по веществу 0,04 в пересчете на Al^{3+}	4	ААС, ИСП по АИ норматив рН
Алюмосиликат гидрооксид натрия, бентонит, С 101	1302-78-9	орг, сан-токс	10,0**	4	Гравиметрия по взвешенным веществам
Альфа-бутил-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандил)] $C_4H_{10}O(C_3H_6O)_nH$	9003-13-8	орг	12,5**	3	ВЭЖХ-МС
Альфа-гидро-омега-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандил)] $H-O(C_3H_6O)_nH$		орг	100,0**	3	ВЭЖХ-МС
Амид ацетоуксусной кислоты $C_4H_7NO_2$	5977-14-0	сан	0,01	4	ГХ, ГХМС
Амидим					
Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль – 88%					
					
Состав: трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль – 12%		токс	0,001	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
					

Амидосульфурон, 3-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-1-(N-метил-N-метилсульфонил-аминосульфонил) - мочевины, д.в. Секатор $C_9H_{15}N_5O_7S_2$	120923-37-7	токс	1,0	3	ВЭЖХ
О-3 α -Амино-6 α [4-амино-4-дезоксид- α -Д-глюкопиранозилокси-(2,3,4,4 α , β ,7,8,8- α -оксигидро-8-гидрокси-7 β -метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]-2-дезоксид-Д-стрептамин Апрамицин $C_{21}H_{43}N_5O_{11}$	37321-09-8	сан	0,4	4	ВЭЖХ
6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол $C_{13}H_{12}N_4$	7621-86-5	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан, АДЭ-3 $C_{13}H_{32}N_2O_3Si$	15129-36-9	орг (цвет, запах), сан, рыб-хоз (запах мяса рыбы)	0,0001	2	ГХ, ГХМС
О-13-Амино-3-дезоксид- α -D-глюкопиранозил-(1-4)-O-2,3,6-тридезоксид- α -D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-дезоксидстрептамин Тобрамицин $C_{18}H_{37}N_5O_9$	2986-56-4	сан	0,4	4	ВЭЖХ
4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота и ее 1-метилгентиловый эфир Флуроксипир, старане-200	69377-81-7	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат, ЦПВ-1 $C_{10}H_{16}N_2 \cdot H_2SO_4$	6283-63-2	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по амину

<p>4-Амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 Метамитрон $C_{10}H_{10}N_4O$</p> <p>Аминопропилтриэтоксисилан, АГМ-9 Состав: γ-аминопропилтриэтоксисилан $NH_2(CH_2)_3Si(OC_2H_5)_3$ β-аминопропилтриэтоксисилан $CH_3\underset{ }{CH}CH_2Si(OC_2H_5)_3$ NH_2 тетраэтоксисилан – не более 9% $Si(OC_2H_5)_4$</p>	41394-05-2	ТОКС	0,005	3	ТСХ
<p>Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота NH_2SO_3H</p>	5329-14-6	сан-токс	0,3 По веществу 0,007 в пересчете на NH_2SO_3	4	Ионная хроматография по $NH_2SO_3^-$
<p>4-Амино-6-третбутил-3-метилгио-1,2,4-триазин-5-он Зенкор $C_8H_{14}N_4OS$</p>	21087-64-9	ТОКС	0,000001	1	ВЭЖХ
<p>4-Амино-1,2,4-триазол Амифол</p>	584-13-4	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС
<p>Состав: аммонийная соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты, аммонийная соль метилиминодиметил-фосфоновой кислоты, аммонийная соль фосфористой кислоты, аммонийная соль соляной кислоты, вода – 15%</p>		ТОКС	0,8	4	ВЭЖХ по компонентам


Аммиак $\text{NH}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$	7664-41-7	токс	0,05	4	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH_4^+
Аммоний-ион NH_4^+	14798-03-9	токс токс	0,5 (в пересчете на азот 0,4); 2,9** при 13-34%	4	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография
Аммоний перхлорат, аммоний хлорнокислый NH_4ClO_4	7790-98-9	токс	0,044 по веществу 0,038 в пересчете на ClO_4^-	3	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону ClO_4^-
Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат $\text{NH}_4\text{SO}_3\text{NH}_2$	7773-06-0	токс	0,01 по веществу 0,007 в пересчете на NH_2SO_3^-	3	Колориметрия, ионная хроматография по NH_2SO_3^-
Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония тиосульфат $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$	7783-18-8	сан-токс	1,6 по веществу 0,5 в пересчете на NH_4^+	4	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH_4^+
Аммония меркаптоацетат	5421-46-5	токс	1,0	4	ВЭЖХ
Аммония этосульфат четвертичный, тетраалкиламмония этосульфат Продукт R-8293 E		токс	0,02**	3	Спектрофотометрия
Амфитор, аммонийная соль алкилфосфористой кислоты $\text{R}(\text{NH}_4)^+ \cdot \text{NH}_4^+$, $\text{R}=\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$, $n=8-10$		сан-токс	0,2	4	ВЭЖХ
Анилин, аминобензол $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$	62-53-3	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ




<p>Анилин солянокислый C_6H_5NCl</p>	142-04-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
<p>Антинат Состав: спорокристаллический комплекс, содержащий эндотоксин бактерий <i>Vacillus thuringiensis</i> – 89,5 % питательная среда: уксусная кислота – 0,5% хлористый натрий – 10,0%</p>		сан-токс	0,01	3	Микроскопия численности клеток
<p>Антипитинговая добавка НИА-1 Состав: сульфирол-8 лимед НИВ-3, раствор натриевой соли аллилсульфокислоты $CH_2=CHCH_2SO_3Na$ и хлористого натрия, полиоксипропиленгликоль, м.в. 600</p> $\begin{array}{c} CH_2-O-(CH_2-CH-O)_n-H \\ \\ CH_3 \\ CH_2-O-(CH_2-CH-O)_n-H \\ \\ CH_3 \end{array}$		орг (запах, пена)	0,03	4	ВЭЖХ по компонентам
<p>Антихлорозин-А, смесь аммонийных солей гидроксиэтилендифосфонатов железа</p> $\left[\begin{array}{c} O \\ \\ -O-P-O- \\ \\ -O- \end{array} \right] \begin{array}{c} OH \\ \\ -C-P-O- \\ \\ CH_3 \end{array} \left[Fe^{3+} NH_4^+ \right]$		сан-токс	1,0	4	Ионная хроматография, ААС, ВЭЖХ

Асфальт сульфонат натрия, Солтекс, С 305 "Атеми - S"	68201-32-1	токс	0,5**	4	Спектрофотометрия
Состав: ципроконазол - 0,8% д.в. се́ра - 80%		токс	0,07	3	ВЭЖХ по ципроконазолу
Ацетальдегид, этаналь C ₂ H ₄ O	75-07-0	орг	0,25	4	ГХ, ГХМС
Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламинид уксусной кислоты C ₈ H ₉ NO	103-84-4	токс	0,004	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
Ацетат 2-алкил-1(2-аминоэтил)-1Н-4,5-дигидроимидазола, где алкил – радикал талловых масел Продукт PR 4659	68140-11-4	токс	0,01**	3	ВЭЖХ
Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый CH ₃ COO ⁻ NH ₄ ⁺	631-61-8	сан	0,1	4	Ионная хроматография по ионам NH ₄ ⁺ и CH ₃ COO ⁻
Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый Ca(CH ₃ COO) ₂ ·H ₂ O	5743-26-0	токс	1,9	4	Ионная хроматография по CH ₃ COO ⁻
Ацетат кобальта тетрагидрат Co(CH ₃ COO) ₂ ·4H ₂ O	6147-53-1	токс	0,01	4	ААС, ионная хроматография по Co ²⁺
Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового спирта, 2-октилацетат C ₁₀ H ₂₀ O ₂	112-14-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС
Ацетаты полипренолов H (C ₅ H ₈) _n C ₂ H ₃ O ₂ где n=14-20		сан-токс	2,5	3	ВЭЖХ
Ацетилацетон, 2,4-пентандион C ₅ H ₈ O ₂	123-54-6	токс	0,39	4	ГХМС, ВЭЖХ
Ацетилацетонат марганца (CH ₃ COCHCOCH ₃) ₂ Mn	14024-58-9	токс	0,01	4	ГХМС, ВЭЖХ ААС




Ацетон, пропанон-2 C ₃ H ₆ O	67-64-1	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС
Ацетонитрил, метил цианистый C ₂ H ₃ N	75-05-8	сан-токс	0,7	4	ГХ, ГХМС
Ацетопрпилацетат, ацетат γ -ацетопрпилового спирта C ₇ H ₁₂ O ₃	5185-97-7	сан-токс	0,1	4	ГХ, ГХМС
γ -Ацетопрпиловый спирт, метил-3-гидроксипрпилкетон, левулиновый спирт, АПС C ₅ H ₁₀ O ₂	1071-73-4	сан-токс	0,5	2	ГХ, ГХМС
Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1 C ₈ H ₈ O	98-86-2	рыб-хоз (запах мяса рыб)	0,04	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
Базагран М ²) Состав: бентазон д.в. (базагран) – 25% 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота, МСРА, (2М-4Х) – 12,5% силиконовая эмульсия – 0,01% вода – до 100%		сан	0,2	4	ГХ по бентазону, по МСРА
Базагран-ХИТ в.р. ²⁾ , Состав: базагран (бентазон) д.в. – 40% 2,4 –Д-аминная соль д.в. – 1,25% вода – до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора		сан	1,7	4	ВЭЖХ по базаграну
Базис ²⁾ 75% с.т.с. Состав: римсульфурун д.в. (титус) – 50% тиофенсульфурунметил д.в. (хармони) – 25% техническая примесь – 1,5% дисперсионный агент – 7% смачивающий агент – 1,5% связывающее вещество – 5% разбавитель – 10%		сан	0,6	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по римсульфуруну, по тиофенсульфурун- метилу

<p>Байтан универсал 19,5 WS²⁾ Состав: триадименол, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси) бутанол-2 д.в. C₁₄H₁₈ClN₃O₂ – 15,0% фуберидазол, 2-(фурил-2)бензимидазол д.в. C₁₁H₈N₂O – 2,0% имазалил, 1-(β-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил)имидазол C₁₄H₁₄Cl₂N₂O д.в. – 2,5%</p>		ТОКС	0,01	3	ГХ по триадименулу, по фуберидазолу, по имазалилу
<p>Байфидан 25% к.э.²⁾ триадименол, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4- триазолил-1)-1-(4хлорфено-кси)-бутанол-2 д.в. C₁₄H₁₈ClN₃O₂ – 23% Барий Ва¹⁾</p>	55219-65-3	ТОКС	0,1	3	ГХ по триадименулу
<p>Бария бис(динонилнафталинсульфонат) Синоним: динонилнафталинсульфоновой кислоты бариевая соль C₅₆H₈₆ВаО₆S₂ Бария сульфат ВаSO₄</p>	7440-39-3	ТОКС орг	0,74 2,0** при 12-18‰	4 4	ИСП, ААС по Ва ²⁺
<p>Бария сульфат ВаSO₄</p>	25619-56-1	орг, ТОКС	10,0**	3	ВЭЖХ-МС
<p>Бензгуанамина формальдегидный олигомер, БГФО (продукт сополиконденсации бензгуанамина салициловой кислоты НОС₆Н₄СООН сульфаниловой кислоты NH₂C₆H₄SO₃H формальдегида) НСНО</p>	7727-43-7	сан-токс	2,0 по веществу 0,74 в пересчете ²⁺ на Ва	4	ИСП, ААС
<p>Бензгуанамина формальдегидный олигомер, БГФО (продукт сополиконденсации бензгуанамина салициловой кислоты НОС₆Н₄СООН сульфаниловой кислоты NH₂C₆H₄SO₃H формальдегида) НСНО</p>		сан-токс	0,01	4	ГХ, ГХМС по формальдегиду

Бензойная кислота C_6H_5COOH	65-85-0	токс	0,01	3	ВЭЖХ
Бензол C_6H_6	71-43-2	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов), соли пиромеллиговой кислоты $C_6H_2(COO)_4Me_n$		сан	1,0	4	ВЭЖХ, ААС, ИСП, ионная хроматография
Бенлат Состав: бензил, N-[1-(бутилкарбамоил) бензоимидазолил-2]-O-метилкарбамат д.в. - 50% $C_{14}H_{18}N_4O_3$ 		токс	0,005	3	ГХ по беномилу
бензоат натрия, диоктилсульфат натрия, октаацетат сахарозы, стабилизатор - 7% сахароза - 43%					
Бериллий Be ¹	7440-41-7	токс	0,0003	2	ИСП, ААС
Бетанал-Прогресс АМ, 18% к.э. ²⁾ Состав: фенмедифам, O-[3-(метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)карбамат д.в. $C_{16}H_{16}N_2O_4$ - 5,7%, десмедифам, N-(3-фенилкарбомойлоксифенил)-O-этил-карбамат д.в. $C_{16}H_{16}N_2O_4$ - 5,7%		токс	0,0006	3	ТСХ, ГХ, ГХМС по фенмедифаму, по десмедифаму


<p>Биофлавоноид дигидрокверцетина C₁₅H₁₂O₇</p> <p>Биферац, 0,1% водный раствор бензимидазольной соли β-хлорэтилфосфоновой кислоты</p> <p>C₉H₁₂N₂O₃PCl</p>  <p><chem>ClCH2CH2-P(=O)(OH)OH</chem></p>	480-18-2	сан-токс	1,0	3	ВЭЖХ
<p>Блескообразователь Лимеда ПОС-1 Состав: 2-окси-1-нафтаальдегид</p> <p>C₁₁H₈O₂ O=C-H</p>  <p>гидрохинон C₆H₆O₂</p> 		токс	0,0001	2	ГХ ГХМС, ВЭЖХ по компонентам
<p>Блескообразователь НИБ-3 Состав: натриевая соль аллилсульфофоскислоты</p> <p>C₃H₅O₃SNa CH₂=CH-CH₂-SO₃Na</p> <p>хлористый натрий NaCl</p>		токс	0,29	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС
<p>Блоксополимер ГДПЭ-067, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов RO(C₃H₆O)_m(C₂H₄O)_kH, R=C_nH_{2n+1}, n=7-12</p> <p>Бор аморфный В</p>	7440-42-8	орг (пена)	0,1**	4	ГХ, ГХМС по спиртам
		токс	0,1	4	АСС, ИСП по В


<p>Бромформ, трибромметан CHBr₃</p> <p>Бульдок 025 ЕС, бетабайтроид</p> <p>Состав:</p> <p>β-цифлутрин, FCR 4545, (1RS)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (RS)-α-циано-4-фтор-3-феноксбензилый эфир д.в. – 2,5%</p> <p>C₂₂H₁₈Cl₂FNO₃</p> <p>эмульгатор – 10% алкилбензол – до 100%</p>	75-25-2	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС
<p>1,4-Бутандиол C₄H₁₀O₂</p>	110-63-4	сан	0,1	4	ГХ, ГХМС
<p>Бутилакрилат, бутиловый эфир акриловой кислоты C₇H₁₂O₂</p>	141-32-2	токс	0,0005	3	ГХ, ГХМС
<p>2-третбутиламино-3-изо-пропил-5-фенилпергидро-1,3,5-тиадиазин-4-он д.в. Ашплауд C₁₆H₂₃N₃OS</p>	69327-76-0	токс	0,1	4	ВЭЖХ
<p>Бутилацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты C₆H₁₂O₂</p>	123-86-4	сан-токс	0,3	4	ГХ, ГХМС

<p>Бутилбензольная фракция (ББФ) Состав: бутилбензол > 70% $C_{10}H_{14}$</p>  <p>изопропилбензол < 15% C_9H_{12}</p>  <p>триметилбензол < 25% C_9H_{12}</p> 		ТОКС	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ ПО КОМПОНЕНТАМ
<p>2-третбутил-5-(4-третбутилбензилгио)-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он д.в. Санмайт, пиридабен, NC-129 $C_{19}H_{25}N_2OClS$</p>	96489-71-3	ТОКС	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
<p>Бутил-β-бутоксипропионат $C_{11}H_{22}O_3$ $C_4H_9OCH_2CH_2COOC_4H_9$</p>		ТОКС	0,001	3	ГХ, ГХМС

третБутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)-метиленаминооксиметил]бензоат д.в. Ортус - 5% д.в. $C_{24}H_{27}N_3O_4$	134098-61-6 / 111812-58-9	токс	0,0003	2	ВЭЖХ
Бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля $C_8H_{18}O_3$	112-34-5	сан-токс	5,0	4	ГХ, ГХМС
Бутилксантогенат натрия $C_5H_9OS_2Na$	141-33-3	токс	0,03	4	ВЭЖХ
Бутилметакрилат, бутиловый эфир метакриловой кислоты $C_8H_{14}O_2$	97-88-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС
Бутиловый спирт, 1-бутанол Синонимы: н-Бутанол, бутиловый спирт $C_4H_{10}O$	71-36-3	токс сан-токс	0,03 0,5**	3 4	ГХ, ГХМС ГХ-МС
Бутиловый спирт третичный, 2-метилпропанол-2, триметилкарбинол $C_4H_{10}O$	75-65-0	сан	1,0	4	ГХ, ГХМС
Бутиловый эфир 2,4-Д, 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты бутиловый эфир $C_{12}H_{14}Cl_2O_3$	94-80-4	рыб-хоз (привкус и запах мяса рыбы и бульона), токс	0,004	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси]-пропионат д.в. Фюзилад, галакон, F-292 $C_{19}H_{20}NO_4F_3$	69806-50-4	токс	0,001	3	ВЭЖХ
цис-4-[3-(4-третбутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин д.в. Корбел (75% д.в.), фенопропиморф, фунбас, форбель, милдо-фикс, 36/01, PO14-3169 $C_{20}H_{33}NO$	67306-03-0 / 67564-91-4	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ

2-(4-третбутилфенокси) циклогексилпропан-2-илсульфит Омайт $C_{19}H_{26}O_4S$	2312-35-8	токс	0,004	3	ВЭЖХ
Бутилцелозоль, буюксизетанол, монобутиловый эфир этиленгликоля $C_6H_{14}O_2$	111-76-2	орг (лена), токс	0,01	3	ГХ, ГХМС
γ -Бутиролактон $C_4H_6O_2$	96-48-0	токс	2,3	4	ГХ, ГХМС
"Валентис", деструктор нефти <i>Acinetobacter valentis</i>		сан, орг (запах)	1,0 $2,5 \times 10^7$ кл/мл	4	Микроскопия численности клеток
Валуб НТ *, смесь жирных кислот, спиртов и их эфиров в алкановой фракции с температурой кипения 200-300 °С		токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия по алканам, кислотам и сложным эфирам
Ванадий V ¹⁾	7440-62-2	токс	0,001	3	ИСП, ААС

<p>Вектра² 10% с.к. Состав: бромуконзол, 1-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурурил]-1-Н-1,2,4-триазол д.в. — 10%</p> <p style="text-align: center;"> $C_{13}H_{12}BrCl_2N_3O$  </p> <p>сополимер алкилфенолэтоксипропоксилат — 8% этоксилированный алкилфенол — 1% антифриз монопропиленгликоль — 1% эмульсия силиконового масла — 2,4% алюминат кремния — 12,5% полисахарид — 0,3% биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) — 0,15% вода — до 100%</p>		ТОКС	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по бромуконзолу 0,01***
<p>Взвешенные вещества инертная природная минеральная взвесь, состоящая из неорганического осадочного материала (глинистые и обломочные минералы, горные породы, силикаты, карбонаты и др.) с дисперсностью частиц от 0,5 мкм Для континентальной шельфовой зоны морей с глубинами более 8 м</p>		орг, сан-токс	10,0**	4	Гравиметрия по взвешенным веществам
<p>Винилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты, уксусновиниловый эфир $C_4H_6O_2$</p>	108-05-4	ТОКС	0,01	4	ГХ, ГХМС
<p>Винилиденхлорид, хлористый винилиден, 1,1-дихлор-этилен $C_2H_2Cl_2$</p>	75-35-4	ТОКС	0,1	4	ГХ, ГХМС

Винилтриэтоксисилан, ГВС-9 $C_8H_{18}O_3Si$	78-08-0	ТОКС	0,01	3	ГХ, ГХМС
Винилхлорид, монохлорэтилен, хлорэтен, хлорвинил C_2H_3Cl	75-01-4	ТОКС	0,000008	1	ГХ, ГХМС
Витасил 385 г/л, к.с. Состав: (г/л): карбоксин (д.в.) – 17,5%; тирам д.в. – 17,5%; лигносульфонат натрия; пропиленгликоль; декстрин; леногаситель (КЭ-10-12); краситель красный катионный 18, сигнальный краситель; вода – 42%		ТОКС	0,0002	3	ВЭЖХ по карбоксину, по тираму (тетраметилтиурам- дисульфид)
Вольфрам W ^{VI}	7440-33-7	ТОКС	0,0008	3	ИСП, ААС
Вольфрамат анион WO ₄ ²⁻		ТОКС	0,0011 по веществу 0,0008 в пересчете на W	2	ИСП, ААС, ионная хроматография по WO ₄ ²⁻
ВПК-101, поливинилбензилтриметиламмоний хлорид 		ТОКС	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру
ВПК-402, ВПК-402а, полидиметилалиламмоний хлорид	26062-79-3	ТОКС	0,00001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру